

Παράρτημα. Χαρακτηριστικά δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ), Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό ΔΝ, αριθμός θανάτων (% θνητότητα) σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό [σύνολο και με προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)], επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ, Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)**

Κρούσματα λοίμωξης από ιό του ΔΝ	Έτος												Σύνολο 2010-2021
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Σύνολο κρουσμάτων	262	100	161	86	15	0	0	48	317	227	145	59	1.420
Κρούσματα ΜΕ προσβολή ΚΝΣ (%)	197 (75%)	75 (75%)	109 (68%)	51 (59%)	14 (93%)	0	0	28 (58%)	243 (77%)	140 (62%)	116 (80%)	38 (64%)	1.011 (71%)
Επίπτωση νόσου με προσβολή ΚΝΣ (ανά 100.000 πληθ)	1,8	0,7	1,0	0,5	0,1	0	0	0,3	2,2	1,3	1,1	0,4	0,9*
Αριθμός (%) θανάτων	35 (13%)	9 (9%)	18 (11%)	11 (13%)	6 (40%)	0	0	5 (10%)	51 (16%)	35 (15%)	23 (16%)	8 (13%)	201 (14%)
Αριθμός (%) θανάτων ασθενών με προσβολή ΚΝΣ	33 (17%)	9 (12%)	18 (17%)	10 (20%)	6 (43%)	0	0	5 (18%)	48 (20%)	33 (24%)	23 (20%)	7 (17%)	192 (19%)

* Μέση ετήσια επίπτωση ετών 2010-2021

** Καταγράφονται οι θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Πίνακας 2. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου (με προσβολή ΚΝΣ), Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Κλινική μορφή νευρο-δισιδυτικής νόσου	%	Αριθμός κρουσμάτων
Εγκεφαλίτιδα/ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα	86,2%	872
Μηνιγγίτιδα	12,4%	125
Οξεία χαλαρή παράλυση (ΟΧΠ) μόνο	1,4%	14
ΟΧΠ +/- εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα*	4%*	42*
Σύνολο κρουσμάτων με προσβολή του ΚΝΣ	100%	1.011

* Συμπεριλαμβάνονται και στις ανωτέρω κατηγορίες.

Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ με προσβολή του ΚΝΣ ανά ηλικιακή ομάδα, Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	%	Αριθμός κρουσμάτων
<20	1,7	17
20-29	1,5	15
30-39	3,7	37
40-49	3,9	39
50-59	9,4	95
60-69	17,6	178
70-79	33,8	342
≥80	28,5	288
Σύνολο	100	1.011

Πίνακας 4. Ποσοστά (%)* περιστατικών με λοίμωξη από ιό ΔΝ, με και χωρίς προσβολή του ΚΝΣ, ανά αναφερόμενο σύμπτωμα/ σημείο, Ελλάδα, 2010-2021 (Πηγή: ΕΟΔΥ)

Σύμπτωμα (αναφερόμενο)/Σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΜΕ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο	Ποσοστό (%) περιστατικών ΧΩΡΙΣ προσβολή ΚΝΣ με το αναφερόμενο σύμπτωμα/σημείο
Πυρετός	99%	93%
Σύγχυση	76%	26%
Γενικευμένη αδυναμία/ καταβολή/κόπωση	75%	75%
Κεφαλαλγία	61%	61%
Υπνηλία	55%	30%
Ανορεξία	53%	51%
Ρίγος	49%	46%
Διάρροια/ ναυτία/ έμετος	49%	48%
Αίσθημα ζάλης	40%	27%
Αρθραλγίες/ μυαλγίες	36%	47%
Τρόμος/ εξωπυραμидικά συμπτώματα	34%	3%**
Αστάθεια	29%	3%**
Εξάνθημα	17%	32%
Κοιλιακό άλγος	16%	20%
Παρέσεις/ παραλύσεις	12%	0%
Οπισθοβολβικός πόνος	11%	19%
Αιμωδίες	10%	7%
Θάμβος όρασης	10%	4%
Διογκωμένοι λεμφαδένες	5%	16%

* Τα ποσοστά υπολογίσθηκαν επί των περιστατικών στα οποία ήταν γνωστή η σχετική πληροφορία.

** Σύμπτωμα κατά αναφορά των ίδιων των ασθενών (ή συγγενών τους).

Σε κάθε τυχόν περαιτέρω χρήση των ανωτέρω επιδημιολογικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι η πηγή τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας («Πηγή δεδομένων: ΕΟΔΥ»).